

Les « Fleurit-Noël » et les « Neige » ...



Ces espèces ont la singularité de se parer, à la fin de l'année, de spectaculaires feuillages et floraisons, d'un blanc plus ou moins pur. Ces caractéristiques de couleur et d'époque sont à l'origine de leurs noms vernaculaires*.



« La neige », *Euphorbia leucocephala* Lotsy,

EUPHORBIACEAE

C'est un arbuste au port en boule, dont le feuillage est presque uniformément vert pendant la majeure partie de l'année. Durant les mois de décembre et de janvier, les extrémités des branches présentent un feuillage différent.

Ce sont les bractées (pièces foliacées qui entourent les fleurs), qui sont le plus souvent blanches mais qui peuvent être roses chez quelques plus rares individus.

Dans les pays anglophones, l'espèce porte le nom de "Christmas bush". (FOURNET, 2002). Les Martiniquais en font des bouquets pour orner leurs maisons à la fin de l'année.

Originaire d'Amérique centrale, il est cultivé dans les jardins de l'île pour l'ornement et ne se reproduit pas dans la nature.

Les branches cassées laissent s'échapper un latex blanc, ce qui est une des caractéristiques de la famille* des EUPHORBIACEAE.



« La neige », *Breynia disticha* J.R. & J.G. Forst.,

EUPHORBIACEAE



Le R.P. DUSS (1897) cite l'espèce sous le nom de *Phyllanthus nivosus* Hort et précise que cet «arbrisseau superbe» introduit était déjà, à son époque, cultivé dans un très grand nombre de jardins.

Ce petit arbuste serait originaire d'Océanie. Très utilisé jadis pour les haies, il se rencontre parfois de nos jours échappé des lieux de culture.

Toutes les feuilles sont diversement tachetées de blanc et plus ou moins de rose. **Selon les variétés, ces taches blanches (et plus rarement roses) dominent largement sur les feuilles des extrémités des rameaux** (FOURNET, 2002).

« Fleurit-Noël », *Eupatorium odoratum* L.

ASTERACEAE

Principaux synonymes :

Osmia odorata (L.) Sch. Bip.

Eupatorium conyzoides Vahl

Eupatorium brachiatum Wickstr

Chromolaena odorata L.

Eupatorium odoratum est un arbrisseau facilement identifiable grâce : à l'odeur agréable qu'il dégage (d'où le nom d'espèce *odoratum*) ; à la pubescence grisâtre qui couvre toute la plante et qui est particulièrement visible au-dessous des feuilles ; à ses feuilles opposées et dentées ; à ses inflorescences denses et blanches qui éclosent entre les mois de décembre et de février.

Cette espèce est très fréquemment plantée dans les jardins car elle a de nombreuses indications dans la pharmacopée traditionnelle, comme en témoignent certains de ses autres noms vernaculaires : «Guérit tout», «Zèb à té», «Zèb à lafyè», «Zèb kont lafyè» (TRAMIL, 1999 - FOURNET, 2002).

Deux autres espèces du genre *Eupatorium*, présentes en Martinique, ont des propriétés médicinales :

- *Eupatorium macrophyllum* L., «Herbe à chat», «Guimauve», originaire des Grandes Antilles et d'Amérique centrale,

- *Eupatorium triplinerve* Vahl, «Diapana», originaire d'Amérique tropicale.

Eupatorium odoratum, originaire d'Amérique tropicale et des Grandes Antilles, est naturalisée* en Martinique où elle préfère les friches ensoleillées peu humides.

Cette espèce a été introduite dans les autres régions tropicales (elle est aujourd'hui pantropicale) et est devenue par endroits une espèce envahissante, notamment dans certaines zones d'Afrique.



“Muguet”, *Poranopsis paniculata* (Roxb.) Roberty

CONVOLVULACEAE

Cette puissante liane originaire du nord de l'Inde et de la Birmanie est reconnaissable à ses feuilles veloutées et en forme de cœur, ainsi qu'à sa floraison blanche, aussi odorante qu'abondante. Cette floraison survient généralement entre les mois de septembre et février, mais surtout au mois de décembre. Les autres noms vernaculaires sont explicites : «Snow-in-the jungle», «Perles de Noël», «Flè Nowèl», ... (FOURNET, 2002). Le muguet fait partie des bouquets décoratifs du jour de l'an.

Le R.P. DUSS (1897) signale l'espèce sous le nom de *Porana paniculata* Roxb., et précise qu'elle a été introduite à la Martinique pour l'ornement par Madame DUPLESSIS, depuis le Brésil et l'Uruguay, en 1875.

Aujourd'hui, bien que plus fréquente aux alentours immédiats des habitations où elle fait l'objet de culture, il n'est pas rare d'observer cette liane grim pant sur les arbres de la végétation naturelle péri-urbaine.



Lexique

Famille : unité de classification de la taxonomie de rang intermédiaire, situé entre l'ordre (rang supérieur) et le genre (rang inférieur). Un ordre est composé de plusieurs familles qui comprennent chacune plusieurs genres.

Genre : unité de classification de la taxonomie de rang intermédiaire, situé entre la famille (rang supérieur) et l'espèce (rang inférieur). Une famille est composée de plusieurs genres qui comprennent chacun plusieurs espèces.

Naturalisée : espèce nouvelle dans un milieu donné et qui se maintient durablement sans l'aide de l'Homme.

Nom vernaculaire : nom commun et usuel de la plante.

Quelques références

DUSS, R.P., 1897. Flore phanérogamique des Antilles françaises. Macon. Protat Frères, Imprimeurs.

FOURNET, J., 2002. Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique. CIRAD. Gondwana Editions.

TRAMIL, 1999. Pharmacopée caribéenne. Le dictionnaire des plantes médicinales. Éditions Désormeaux.

Synthèse : Elisabeth ETIFIER-CHALONO - Commission Scientifique restreinte : J.-P. FIARD ; P. JOSEPH ; M. TANASI
Photos et Collections : CBAF Antenne Martinique ; clichés : EEC

